

醫心方卷第六

之立立子咸專三言三又入一又言亦夏有果

醫心方卷第六

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治胃痛方第一

治脇痛方第二

治心痛方第三

治腹痛方第四

治心腹疼痛方第五

治心腹脹滿方第六

治卒腰痛方第七

治緊腰痛方第八

治腎著腰痛方第九

治肝病方第十

治心病方第十一

治脾病方第十二

治肺病方第十三

治腎病方第十四

治大腸病方第十五

治小腸病方第十六

治膽病方第十七

治胃病方第十八

治膀胱病方第十九

治三焦病方第二十

治氣病方第二十一

治脉病方第二十二

治筋病方第二十三

治骨病方第二十四

治髓病方第二十五

治皮病方第二十六

治完病方第二十七

治胃痛方第一

病源論云胃脇痛者由膽与肝及腎之文脉虛為

寒氣所乘故也此三經之文脉並脩行胃脇耶氣乘

治筋病方第廿三

治骨病方第廿四

治髓病方第廿五

治皮病方第廿六

治完病方第廿七

治胃痛方第一

病源論云胃腸痛者由膽與肝都散反又腎之支脈虛為

寒氣所乘故也此三經之支脈並循行胃腸耶氣乘

於胃腸故傷其經脈耶氣之與正氣交擊故令胃

腸相引而急痛也カラ

葛氏方治胃痺之病令人心符部及腹內結病也中堅痞急痛肌中苦

痺絞急如刺不得俛仰其胃前皮胃痛不得犯胃

滿短氣啞啞引痛煩悶白汗出或微引背脊セナカノホネ不語

之數日致人方

橘皮一升枳實四枚生薑半斤水四升煮取二升分

為再服カラタキ
令茶小品方枳實
三兩水五升

又方若已差復更發者取ミソノホ並根五斤搗ハギシホ取汁飲之

立愈

千金方云胃痺之病令人心ミソノホ中堅痞急痛肌中苦痺絞

急如刺不得俛仰其胃中ミソノホ滿咽塞習ノホトリ痺喉中

乾燥時欲嘔吐胃及背引痛ミソノホ不得犯胃滿短氣

啞啞引痛煩悶白汗出或微背引痛忽不知治致人方

枳實四枚厚朴三兩ミソノホ並根カラタキ一升カラタキ桔梗子一枚

桂心一兩五味水七升煮取二升半分再服

蘇驗方治胸痛達背不得卧方

急如刺不得倪仰其胃中痛如滿咽塞習痺喉中
乾燥時欲嘔吐胃及背引痛不得犯胃滿短氣

啖引痛煩悶日汗出或微背引痛忽不知治欬人方

枳實四枚 厚朴三兩 薤白一斤 桔樓子一枚

桂心一兩 五味水七升煮取二升半分再服

錄驗方治胸痛達背不得卧方

大枯樓實一枚 薤白三升 半夏半升 生薑六兩

凡四物切以漬漿一斗煮取四升一服一升

極要方療胃滿氣脹心腹中冷方

半夏一升 洗桂心八兩 生薑一斤

右以水七升煮取二升七合日三服

醫門方療冷氣胃中妨滿或痛方

半夏四兩 生薑五兩 厚朴四兩 炙甘草六升煮取二升

去滓分溫二服相去八九里頓服二三劑

治腸痛方第二

病源論云耶氣客於足少陽之絡令人腸痛

葛氏方治腸卒痛如得打方以繩橫度兩乳中間屈

繩從乳橫度以繩痛脇下冬繩下屈夏伸

小品方治脇下偏痛茲契其脈弦此寒也當以溫藥

其寒大黃附子湯方大黃三兩附子三枚細辛兩

凡三物以水三升煮取二升分二服

千金方治冷氣脇下注來腸痛引脇背當歸湯方

當歸二兩 吳茱萸二兩 伏苓一兩 桂心二兩

繩從乳橫度以繩下屈

小品方治脇下偏痛發熱其脈弦此寒也當以溫藥

其寒大黃附子湯方大黃三兩附子二枚細辛兩

凡三物以水三升煮取二升分二服

千金方治冷氣脇下注來腸痛引脇背當歸湯方

當歸二兩吳茱萸二兩茯苓一兩桂心二兩

干薑三兩枳實一兩人參一兩芍藥二兩

大黃二兩甘草二兩

十味以水八升煮取二升半一服八合日三服

公佳今案極方有二地又之治兩脇下痛方

契湯漬兩足冷則易

治心痛方第三

病源論云心痛者風冷耶氣乘於心也其病發有

死者有不死成痼者心為諸主而藏神其心經不

可傷之而痛為真心痛朝發夕死夕發朝死心

有艾別之絡脈其為風冷所乘不傷於心經者亦令

心痛則下同下甚故成痼不死

葛氏方治卒心痛方

當力以自吐若男子病者令婦人以一坏水与飲

之若婦人病者令男子以一坏水与飲之得新汲井

水尤佳又方吳茱萸五合桂一兩酒二升

煮取一升分二服又方吳茱萸二升生薑四兩

豉一升酒六升煮取二升分三服又方切生薑

心方治心

當力以自吐若男子病者令婦人以一坏水与飲之若婦人病者令男子以一坏水与飲之得新汲井

水尤佳 又方吳茱萸五合 桂一兩 酒二升

煮取一升分二服 又方吳茱萸二升 生薑四兩

豉一升酒六升煮取二升半分三服 又方切生薑

若干薑半升以水二升煮得一升去滓頓服之

又方取竈中契灰アハヒ去灰芥アハヒ燔アハヒ慰心上アハヒ冷復易

錄鈴方治卒心痛方 薑大豆若煮之以囊盛更燔以

熨心上アハヒ冷復易之已熨之豆不可令畜生犬等食之即

死 又云治人心痛アハヒ懷アハヒ懷アハヒ情アハヒ悶アハヒ藥アハヒ引アハヒ雨アハヒ乳アハヒ立アハヒ或如

荆困極桂湯方 桂心半兩 茱萸二升 芍藥三兩

當歸二兩 生薑半斤 凡五物切以水一斗二升煮取四

升服一升日三夜一有驗元生薑用干薑五升代

脩急方治心痛アハヒ作アハヒ塩湯飲三升吐則即老

背婆方治卒心痛欲死方

吳茱萸三兩 芍藥三兩 桂心三兩

右以淳酒大一升生煮之令有半升在頓服

僧深方治卒心痛方 當歸二兩 芍藥一兩 桂心一兩

人參一兩 文子一作一枚 五物アハヒ咀アハヒ咀アハヒ以水七升煮取二升半分

服五服 又云治卒心痛附子九方 人參二兩 桂心二兩

干薑二兩 蜀附子二兩 巴豆二兩

凡五物下篩蜜丸如大豆先食服三丸日一神良

新蘇方治心痛方 飲井花水二升 又方取熱湯漬手

僧深方治卒心痛方

當歸二兩

夕藥一兩 桂心一兩

人參一兩 文子亦一枚

五物攻咀

以水七升煮取二升半

眼五服 又治卒心痛 附子九方

人參二兩 桂心二兩

干薑二兩 蜀附子二兩 巴豆二兩

凡五物下篩蜜丸如大豆先食服三九日一神良

新錄方治心痛方

飲井花水二升

又方以熱湯漬半

足以老為度

又方燒秤錘令赤投二升酒中分二服

又方水服米粉一匙 集驗方治卒心痛方

桂心八兩以水四升煮取一升半分再服 鑒真方治心痛

方大驗酢半升切葱白一莖和煎頓服立愈

范汪方治卒心痛一物桂心散方 桂心一兩 為散溫酒

服方寸上日三不飲酒以米飲服之

又云備急丸方巴豆一分 大黃二分 干薑二分 楊節異

治巴豆合丸如大豆有急取二三丸以水服之

如意方治卒心痛

書地作

五字撮中央以水一升

攪飲之 小品方解急蜀椒湯主寒病心痛如刺繞

吞笑痛腹中盡痛白汗欲絕方 蜀椒三百枚

一方二百枚 附子一枚 梗米半升 干薑半升 大棗廿枚

半豆十二枚 甘草一兩 凡七物以水七升煮取三升

湯成契服一升 吞老腹脹一升數用治心痛最良

千金方九痛丸主九種心痛一虫心痛二淫心痛三風心

痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛

九生來心痛方悉主之并治冷腫上氣落馬墮東方

一方二百枚 附子一枚 粳米半升 干薑半升 大棗十枚

半夏十二枚 甘草一两 凡七物以水七升煮取三升

湯成契服一升 不^レ差 腹脹一升 數用治心痛最良

千金方九痛九主九種心痛一虫心痛二淫心痛三風心

痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛

九生來心痛方悉主之并治冷腫上氣落馬墮東方

附子二两 巴豆八两 生狼毒一两 人參一两

干薑一兩 食茱萸一两 六味蜜和空腹服如梧子三

九 卒中惡腹痛口不言二日一服連年積冷流注心胃

者立服之好將息亦驗 又方龍白皮汁煮空腹服

之 又云凡暴心痛面無色欲死方以布裹衣塩如

彈丸燒令赤置酒中消服之 又云冬心痛方

心懊憹微痛煩逆 心痛如刀刺氣結 心痛

心痛旬痺 心痛冷氣上 心痛果絞急絕欲

心痛惡氣上腸急痛 心痛果絞急絕欲

死 心痛果惡風 心痛旬脇滿期

救急單驗方冷心痛方 吳茱萸一升桂心三兩當歸

三兩 檉末蜜丸如梧子酒服廿九日 漸加卅丸以知

為度 又云細心痛方 取蠅糞燒令赤末之酒

服驗 又云一切心痛方 生油半合溫服立愈

又方服當歸末方寸匕和酒服 孟詵食注治心痛

方酢研青木香服之

救急單驗方治心痛方 吳茱萸一升桂心三兩當歸

三兩檮末蜜丸如梧子酒服卅九日并漸加卅丸以知

為度 又云細心痛方 取蠅糞燒令赤末之酒

服驗 又云一切心痛方 生油半合溫服立愈

又方服當歸末方寸匕和酒服老 孟詵食注治腹痛

方 酢研青木香服之

治腹痛方第四

病源論云腹痛者由府藏虛冷熱之氣客於腸胃

募原之間結聚不散正氣與邪氣交爭相擊故痛

具有冷氣搏於陰注者則腹痛而腸鳴謂之寒中

葛氏方治卒腹痛方 書舌上作風字 又方搗桂下

節服三方寸匕 苦參忌佳干薑亦佳 又方食鹽一大

握多飲水送之當吐而差 又方掘土作坎以水滿坎中

煎攪取汁飲之 又方令人騎其腹溺香中之

又方米粉一升水二升和飲之 如意方治卒腹痛術

書帛作兩蜈蚣相交吞之 今案葛氏方用之

醫門方治腹痛方 桂心三兩切以水一升八合煮得八

合去滓頓服元桂心煮干薑之佳 范汪方云當歸湯主寒

腹痛方 當歸三兩桂心三兩甘草二兩干薑三兩

凡四物水八升煮得三升服一升日三又當歸

九 治寒腹痛如刀刺方 當歸三分芍藥三分黃

芩四分桂心一分凡四物治痢和蜜丸如梧子服五

先食日三

腹痛方 當歸三升 桂心三升 甘草二兩 干薑三兩

凡四物水八升 煮得三升 服一升 日三 又 當歸

九 治寒腹痛如刀刺方 當歸三升 芍藥三升 黃

芩四升 桂心一升 凡四物治痢和蜜丸如梧子服九

先食日三

千金方 溫脾湯 治腹痛 膈下繞結 遠膈不止方

當歸五升 干薑五兩 附子三兩 甘草二升 大黃五兩

人參三兩 芒消三兩 七味以水七升 煮取三升 分三服 日三

又方 治腹痛方 灸巨闕穴在鳩尾下一寸

又方 灸水穴在膈上一寸 又方 灸中極穴在膈下四寸

治心腹疼痛方第五

病源論云 心腹疼痛者 由府藏虛弱 風寒客於其間

故也 耶氣發作 与正氣相擊 上衝於心 則心痛 下攻

於腹 則痛 上下相攻 故心腹絞痛 氣不得息 葛氏

方云 凡心腹疼痛 若非中惡霍亂 皆是宿結冷積 所

為也 治心腹俱脹 痛短氣 欲死 或已絕方 桂三升

切以水八升 煮得八合 去滓 煩服 无桂者 干薑五升

千金方 治心腹卒絞痛 如刺 兩脇支滿 煩悶 不可堪 思

方 高梁薑五升 原朴二兩 當歸二兩 桂心二兩

四味 切以水八升 八合 煮取一升 八合 分三服 一服六合

日二 若一服痛止 便停 不須更服 若人強者 一服一升

為再服 日二 小品方 治寒疝心腹疼痛方 夫寒疝腹中

痛 逆冷 手足不仁 若一身疼痛 多刺 諸藥所不能治者

千金方治心腹卒絞痛如刺兩脇支滿煩悶不可堪思

方 高粱薑五兩 原朴二兩 當歸二兩 桂心二兩

四味切以水八升八合煮取一升八合分爲三服一服六合

日二若一服痛止便停不須更服若人強者一服一升

爲再服日二 小品方治寒疝心腹痛方夫寒疝腹中

痛逆冷手足不仁若一身疼痛多刺諸藥所不能治者

桂枝湯加烏頭湯主之 桂肉三兩 生薑三兩 甘草

二兩 芍藥三兩 大棗十二枚 烏頭五枚 破之以蜜一升 煎

凡五物以水七升煮取二升半內蜜煎服五合日三

搗要方療心腹久寒卒發欲知鬼刺欲死湯方吳茱

萸二升 香豉三合 生薑四兩 右以好酒五升煮取二

升分服下喉杯未去口病便愈 令咽水 又言療在

心腹痛不可忍方 右取桃東引枝削去蒼皮取白

皮一握以水二升煮取半升服之 醫門方療卒

心腹痛方 厚朴三兩 桂心二兩 以水三升煮取一

升服之若卒痛如刺者但煮桂汁飲之佳 僧深方治

惡氣心腹欲死方 芍藥一兩 甘草二兩 桂心一兩

當歸二兩 凡四物水五升煮取二升分再服

耆婆方治人心腹絞痛不心方 生薑十兩 桂心三兩

甘草三兩 人參二兩 四味切以水一斗煮取二升分三服

治心腹脹滿方第六

病源論云心腹脹者脾虛而耶氣客之乘於心脾故也

葛氏方治卒苦心腹煩滿 又胃脅痛欲死方

當歸二兩

凡四物水五升煮取二升分再服

耆婆方治人心腹絞痛不心方 生薑十兩 桂心三兩

甘草三兩 人參二兩 四味切以水一斗煮取二升分三服

治心腹脹滿方第六

病源論云心腹脹者脾虛而耶氣客之乘於心脾故也

葛氏方治半苦心腹煩滿 又胃脘痛欲死方

以契湯令的ハタカカラ尔清手足冷復ヒタセ秘方又方炙乳下一寸

七味 又方枳實イヌエ汁服一二升

又方判薑ツミ根煮取汁服三升 桂要方備急丸療

忽ハタ然心腹脹滿急痛氣絕大小便不通方 大黃五兩

干薑二兩 巴豆三兩 去心ヒ薑消三兩

右蜜丸平曉飲服四丸不利セハセ更加一二丸取得ヒ五

度利モシ如不心取醋ヒノ飲心之新錄方治心腹煩滿方

桃人去皮搗如泥契酒服如棗二枚日三 又煩滿シクセ吐

逆方 生薑一斤 合皮切搗取汁溫服之 又方生薑シクセ搗

取汁服一合二合 醫方云凡患ハタカカラ脹滿ハタカカラ類以利

藥下之心腹中痛タビ妨不去氣又築心者ヨリ鑲胃中虛氣

上衝心故也 人參三兩 甘草三兩 炙橘皮二兩アタマ來升

顆水七升煮取二升半ヒトツカシノヒル降久溫三服若心アタマ忙加伏苓三兩

又云腹脹滿不能服藥導之方 取獨頭蒜ヒトツカシノヒル燒令熟

去皮及契ナカラ以薄綿裹內下部佳冷易之 又方暖生薑アタマ

削綿裹內下部中冷易之佳 耆婆方治人腹脹痛方

厚朴三兩 高梁薑三兩 切以水三升煮取一升半少

上衝心故也 人參三兩 甘草三兩 桑橘皮二兩 桑葉

顆水七升煮取二升半去降久溫三服若心忪臍空及心動也加伏苓三兩

又云腹脹滿不能服藥導之方 取獨頭蒜燒令熟

去皮及契ナカラ以薄綿裹內下部佳ヒトリ冷易之 又方暖生薑

削綿裹內下部中冷易之佳 耆婆方治人腹脹痛方

厚朴三兩 高梁薑三兩 切以水三升煮取一升半少

契飲之乃止 僧深方云厚朴湯治腹滿數十日脈浮

數食飲如故方 厚朴半斤 枳實五枚 大黃四兩

凡三物以水一斗二升煮取五升內大黃 薇火煎令

得三升先食服一升日三

本草云可梨勒水摩ルチ或散水服之 藥散本草注

云檳榔子搗末服之 孟諸食經云薤可作宿殖

空腹食之

治半腰痛方第七

病源論云腎主腰腎經虛損風冷乘之故腰痛也

又耶客於足大陰之絡令人腰痛引小腹ホソハタ不可以作息

凡腰痛有五一日少陰二腎也十月万物陽氣皆傷

是以腰痛二日風痺風寒著腰是以腰痛三日腎虛

使用傷腎是以腰痛四日繫腰墮墜傷腰是以腰

痛五日寢卧濕地是以腰痛 養生方云飲食勿

即卧么作氣病令腰痛疼 又云憂多則腎轉

腰痛 千金方杜仲酒治五種腰痛云桑寄生杜

仲 鹿茸桂心 四味分等末服方寸匕日三

是以腰痛二日風痺風寒着腰是以腰痛三日腎虛

後用傷腎是以腰痛四日緊腰墮墜傷腰是以腰

痛五日寢卧濕地是以腰痛 養生方云飲食勿

即卧么作氣病令腰痛疼 又云變多則腎轉

腰痛 千金方杜仲酒治五種腰痛家來寄生杜

仲 庶茸挂心 四味分等末服方寸匕日三

又方治腰脊疼不隨么方 庶茸者上皮取白者

葵黃末酒服方寸匕日三 特禁生菓餘不禁新者

良陳者不服角中黃壤亦不中服大 神良 今幸葛

庶茸 尤佳 錄驗方治腰脚疼不可忍不能立胡麻散方取胡

麻葵令香於臼內搗碎即以沙羅蒂之數之蒂之

若不數蒂即脂出不可蒂合皮日一服每服小升服

盡藥斗三升永無腰脚之疼此藥辟穀不飢多

服即減食 以酒及飲蜜湯羹汁亦並得服且元禁

小品方云灸腰痛法 令病人正蹲立以竹杖拄地

度至脊以度注地背心灸脊脊上隨年炷灸竟藏

竹分令人得之灸丈夫痔下血及脫肛不入及息

下長泄利婦人女子月崩去血乍心乍發及帶下

淋瀝長者赤白雜汁皆灸此 又使兩傍各一寸復

灸之為橫三穴間一寸也 又灸腰目小耶在尻上左

右陷處是也 葛氏方治卒腰痛不得俯作方

正倚立竹以度其人足下至脊斷竹又以度之背

心倚立竹以度其人足下至脊斷竹又以度之背

下長泄利婦人女子月崩去血乍心乍發及滯下

淋瀝長者赤白雜汁皆灸此又使兩傍各一寸復

灸之為橫三穴間一寸也又灸腰目小耶在尻上左

右陷處是也葛氏方治卒腰痛不得俯作方

正倚立竹以度其人足下至脊斷竹又以度之背

後當脊中灸竹上頭處退年壯畢歲竹勿令人

得之又方去窮脊上一寸灸七壯其左右各一

寸灸七壯范汪方治腰卒痛物急不得喘息者

醉罷得之欲死大豆紫湯方大豆一斗熬令

好酒二斗二物合煮令熟沸隨人多少服令醉

醫門方療卒腰痛不得轉側方鹿角一枚長五六

寸截之燒鹿角令赤內酒中浸之須臾又燉還內酒

中如此數度破碎便即浸之一宿平晨空腹飲令醉愈

治緊腰方第八病源論云緊腰者謂卒然損傷於腰而致病也此由

損血搏於腰脊所為久不已令人氣息少而无顏色

損腎之故也葛氏方云概腰者是及腰忽動轉

而梳之治概腰痛欲死方生葛根削之爵咽其汁

多之蓋佳又方生地黄搗絞取三升煎得二升內蜜

一升日三服不差更作又云治及腰脊血痛方搗

桂下篩三升許以苦酒和以墜痛上千復墜又方

灸足踵白審際三壯范汪方治概腰方寄生來

上者灸脊背佳心法丹分等為散服方寸匕日三又方

而梳之治概腰痛欲死方 生葛根削之爵咽其汁

多之益佳 又方生地黄搗绞取三升煎得二升內蜜

一升日三服不寒更作 又方治及腰脊血痛方 搗

桂下篩三升許以苦酒和以墜痛上千復墜 又方

冬足踵白密際三味 范汪方治概腰方 寄生來

上者 鹿茸桂心牡丹分等為散服方寸匕日三又方

足跟白肉際三丸 又方灸腰目十九

治腎著腎痛方第九

病源論云腎經虛則受風冷內有積水風相搏漬

於腎氣內著不能宣通故腎痛其病之狀身

驢冷腰腹重如帶五千錢狀如坐於水形狀如水不渴

小便自利食如故久變為水病

千金方云腎著之為病其人身驢重腎中冷所以如

水洗火又不渴小便自利食飲如故是其證也

作勞汗出衣裏冷濕久之故得也腰以下冷痛腹重如

帶五千錢腎著湯主之 甘草一兩 干薑二兩 伏苓

四兩 白朮四兩 四味水五升煮取三升分三服腎中即

溫 今案集驗方元本 僧深方伏苓湯治腎著之為病從

腰以下冷痛而重如五千錢腹腫方

乾膝八兩 白朮四兩 伏苓四兩 干薑二兩 甘草二兩

凡五物以水一斗煮取三升去滓內饴令得四服

治肝病方第十

病源論云肝氣盛為血有餘則病自赤兩脇下痛

溫今案集驗方元本僧深方伏苓湯治胃署之為病後

腰以下冷痛而重如五千錢腹腫方

飴膠八兩了人白朮四兩了人伏苓四兩干薑二兩甘草二兩

凡五物以水一斗煮取三升去滓內飴トカ令トカ洋分四服

治肝病方第十

病源論云肝氣盛為血有餘則病自赤兩脇下痛

引小腹善怒氣逆則頭眩耳聾不聰痛或作アヒヒ頰腫是為

肝之實也則寫之肝氣不足則病目不明兩脇物急キツミ

筋牽不得大息凡凡甲枯面青善悲恐如人將捕之是

為肝氣之虛也則宜補之千金方治肝虛寒脇下

痛脹滿氣急眼昏濁視不明攢柳湯方

母薑七兩附子七兩丁ホト攢柳口伏三兩桔梗四兩

橘皮三兩白朮四兩トカ吳茱萸五合桂心三兩九味

以水九升煮取三升去滓分三服又治肝實契目

痛胃滿急塞アセリ馬肝アセリ前胡湯方アセリ前胡三兩秦皮

三兩ミラノネクセ細辛三兩クナノネセ艾子人三兩黃芩三兩蜀升麻三兩

薤白三兩アセリ決明子三兩アセリ苦竹葉一升オホハコ車前子切一升

芒消三兩十一味以水九升煮取三升去滓下芒消アセリ分三

服錄驗方補肝湯治肝氣不足脇下滿筋急不得

大息アセリ厥逆アセリ倉心脚中痛兩目不明面青方牛黃一兩

烏頭四兩オウ栝子四兩ヒノア大棗十枚龍膽四兩アセリ凡五物切以

水五升煮取一升去滓一服アセリ令盡

僧深方馬肝湯治肝氣實目赤アセリ若黃脇下急小便

芒消三升 十一味以水九升 煮取三升 去滓 下芒消 分三

服 錄驗方補肝湯治肝氣不足 脇下滿 勸急不得

大息 厥逆 驚心 胸中痛 兩目不明 面青方 牛黃一兩

烏頭四升 栝子四升 大棗十枚 龍膽四兩 凡五物切以

水五升 煮取一升 去滓 一服 令盡

僧深方 寫肝湯治肝氣實 目赤若黃 脇下急 小便

難方 人參三升 生薑五升 黃芩二兩 半夏一升 洗

甘草二升 大棗十四枚 凡六物切水五升 煮半 復令三

四沸 內藥後 內薑 煮取二升 去滓 分二服 羸人三服

治心病方第十七

病源論云 心氣盛為祿 有餘則病 胃內痛 脇支滿

膺背膊髀間痛 兩臂內痛 善笑不休 是為心氣之

實也 則宜寫之心氣不足 則胃腹相引痛 驚悸

惚少 顏色古本 強善憂悲 是為心氣之虛也 則宜補之

千金方治心虛 寒心中滿 脹悲憂或夢山丘 平澤半

夏補心湯方 半夏六兩 洗 宿薑三兩 伏苓三兩

白朮四兩 防風二兩 桂心三兩 遠志二兩 檮皮三兩

九味切以水一斗 煮取三升 分三服

錄鈴方治心上虛 契胃中時痛 口生瘡 四大羸色少

氣方 莖胡四升 升麻三升 黃芩三升 生地黄

八兩 夕葉四升 地骨白皮五升 枳實三兩 炙 生

薑三兩 竹葉二兩

凡九物切以水八升 煮取二升 七分 分三服

九味^{ヒキヨモキ}以水一斗^{トリノアシク}煮取三升^{三升}分三服

錄鈴方治心上虛契胃中時痛^ナ口生瘡^ナ四大羸^ナ色少

氣方^{ヒキヨモキ} 苡胡^{ヒキヨモキ}四升^{トリノアシク} 升麻^{トリノアシク}三升^{三升} 黃耆^{ヒキヨモキ}三升^{三升} 生地黄^{ヒキヨモキ}

八兩^{ヒキヨモキ} 芍藥^{ヒキヨモキ}四升^{トリノアシク} 地骨白皮^{ヒキヨモキ}五升^{五升} 枳實^{ヒキヨモキ}三兩^{三兩} 炙^{ヒキヨモキ} 生

薑三兩^{ヒキヨモキ} 竹葉二兩^{二兩}

凡九物切以水八升煮取二升七合^{三升}分三服

耆婆方治人心中^{ヒキヨモキ}契風見鬼^{ヒキヨモキ}親合^{ヒキヨモキ}陰陽且便^{ヒキヨモキ}少^ナ

黃瘦不能食日^{ヒキヨモキ}轉羸方

龍膽^{ヒキヨモキ}三分^{三分} 苦參^{ヒキヨモキ}三分^{三分} 右二味為散以白米飲一服一錢

日二服忌^{ヒキヨモキ}猪^{ヒキヨモキ}宜酒^{ヒキヨモキ}麵^{ヒキヨモキ}

治脾病方第十二^{ヒキヨモキ}

病源論云脾氣盛為形有餘則病腹脹^{ヒキヨモキ}波不利身

重^{ヒキヨモキ}口苦^{ヒキヨモキ}飢^{ヒキヨモキ}足不收^{ヒキヨモキ}行善^{ヒキヨモキ}挈^{ヒキヨモキ}脚下痛^{ヒキヨモキ}是為脾氣之實也

則宜^{ヒキヨモキ}寫之脾氣不足則四支不用^{ヒキヨモキ}後世食不化^{ヒキヨモキ}逆^{ヒキヨモキ}

勝^{ヒキヨモキ}鳥^{ヒキヨモキ}是為脾氣之虛也則宜補之

那繁方療脾虛寒勞損氣脹^{ヒキヨモキ}意滿食不下通噎^{ヒキヨモキ}消

食方 猪膏三升 宿薑汁五升 吳茱萸一升 白朮

一升 檉葉^{ヒキヨモキ}莫^{ヒキヨモキ}等二物為散內薑汁膏中^{ヒキヨモキ}炙取六升^{ヒキヨモキ}燂酒

進方寸匕日再服 千金方治脾實契^{ヒキヨモキ}古本^{ヒキヨモキ}強直或

夢歌樂而體重不能行^{ヒキヨモキ}寫契湯方 苡胡^{ヒキヨモキ}三分

伏苓^{ヒキヨモキ}三分^{三分} 玄參^{ヒキヨモキ}二分^{二分} 大青^{ヒキヨモキ}二分^{二分} 龍膽^{ヒキヨモキ}三升^{三升} 細辛^{ヒキヨモキ}三升

杏仁^{ヒキヨモキ}四升^{四升} 芒消^{ヒキヨモキ}三升^{三升} 苦竹葉^{ヒキヨモキ}切一升^{一升} 九味水^{ヒキヨモキ}九升

煮取三升^{ヒキヨモキ}分三服

進方寸匕日再服 千金方治脾實契古本強直或

夢歌樂而體重不能行寫契湯方 茈胡二分

伏苓三分 玄參二分 大青二分 龍膽三分 細辛二分

杏人四分 芒消三分 苦竹葉切一升 九味水九升

煮取三升分三服

搓要方療脾契內契肩膝渴多腫身重方以生地黄

五兩搗之以水絞取汁漬梅蜜和服之

又方取芥菜汁一升一服 又方麥門冬汁服之

廣洛方主脾胃中契渴欲得飲冷水不下食方

伏苓四兩 甘草二兩 石膏五兩 地骨白皮三兩

第根切一升 切以水八升煮取二升五合絞去滓

分溫三服忌契麵契肉海藻猪蒜

僧深方溫脾湯治脾氣不足虛弱下利上入下出方

干薑三兩 一人參二兩 附子二兩 甘草三兩 大黃

三兩 凡五物以水八升煮取二升半分三服應

得下去毒實甚良

治肺病方第十三

病源論云肺氣盛為氣有餘則病喘欬上氣轉筋痛

汗出尻陰股膝踠胫足皆痛是為肺氣之實也則宜

寫之肺氣不足則少氣不能報息耳聾啞乾是為

肺氣之虛也則宜補之

千金方治肺虛寒之小腸物急腰痛羸瘠百病連

中湯方 大棗十枚 干薑三兩 炙甘草三兩

病源論云肺氣盛為氣有餘則病喘欬上氣轉筋痛

汗出尻陰股膝踠胫足皆痛是為肺氣之實也則宜

寫之肺氣不足則少氣不能報息耳聾啞乾是為

肺氣之虛也則宜補之

千金方治肺虛寒之小腸物急腰痛羸瘠百病達

中湯方 大棗半枚 干薑三兩 芍藥二兩 甘草三兩

桂心三兩 五味水八升煮取三升去滓內枳八兩煮三

沸分三服

又之治肺實則胃喘作息泄氣除契方

枸杞根皮二升 白前三兩 石膏八兩 杏仁三兩 橘皮五兩

白朮五兩 赤蜜七合 六味水七升煮取二升去滓下蜜

煎兩三沸分三服

治腎病方第十四

病源論云腎氣盛為志有餘則病腹脹食泄體腫

喘欬汗出面目黑小便黃是為腎氣實也則宜寫之

腎氣不足則厥腰背冷胃內痛耳鳴苦龍耳是為腎

氣之虛也則宜補之

千金方治腎虛寒陰萎脊

腰痛身重緩弱言音混濁陽氣損絕方

生地黃五斤 干絳容八兩 白朮八兩 巴戟天八兩 麥門

冬八兩 伏苓八兩 甘草八兩 牛膝八兩 五味子八兩

車前子五兩 杜仲八兩 干薑五兩 十二味為散 食後酒服方寸匕日三

又之治腎實契方 腰滿四支心黑耳聾夢腰脊離解夢

腰痛身重。緩弱言音混濁。陽氣煩絕方。

生地黃五斤唐一 干絰容八兩 白朮八兩 巴戟天八兩 麥門

冬八兩 伏苓八兩 甘草八兩 牛膝八兩 五味子八兩

車前子五兩 杜仲八兩 干薑五兩 十二味為散

食後酒服方寸匕日三

又治腎實契脹滿四支正黑耳聾夢腰脊離解夢

伏水等氣急。寫腎陽方。大黃三兩以水一升。蜜器中宿漬。碎如雀頭大。

生地黃五兩 甘草二兩 伏苓三兩 葱白八兩 昌蒲五

兩 黃芩三兩 玄參四兩 細辛二兩 芒消三兩

十味以水九升。煮八味取二升五合。去滓。別漬大黃

內藥中更煮取二升三合。去大黃滓。下地黃汁。微

火煎一兩沸。下芒消。分三服。

耆婆方治腎氣虛。則夢使人見舟船。溺人。冬時夢見

伏水中。及在水行。若有恐畏。惡人見。腎氣盛。則夢見

腰脊兩解。不屬不連。厥氣客於小腹。則夢聚邑街衢。

方秦膠イカリ 石斛イハク 澤馬ナナ 防風ハク 人參ハク 伏苓 黃芩

干地黃 遠志唐一 各八分

十味切。搗篩為散。以酒服。方寸匕。日二

治大腸病方第十五

病源論云。大腸氣盛。則為有餘。則病腹內切痛如錐

刀刺。無休息。胃背寒痺。寧息。是為大腸之氣實也。

則宜寫之。大腸氣不足。則寒氣客之。善世

是為大腸氣之虛也。則宜補之。

十味切搗篩為散以酒服方寸匕日二

治大腸病方第十五

病源論云大腸氣盛則為有餘則病腹內切痛如錐刀刺無休息力事有脅背寒痺縮也是為大腸之氣實也

則宜瀉之 大腸氣不足則寒氣容之善也

是為大腸氣之虛也則宜補之

千金方治大腸虛寒利下青白腸虛鳴相逐黃連補

湯方 黃連四兩 伏苓三兩 芍藥三兩 酸石榴皮

五具 地榆五兩 伏龍肝カニク鷄子一枚 六味切水七升煮

取二升五合去滓下伏龍肝屑攪繞調分三服又治

大腸實契腸脹不通口生瘡生薑泄腸湯方

宿薑三兩 橘皮三兩 大棗十四枚 青竹茹三兩

生地黃十兩 桂心一兩 黃芩三兩 艾子人三兩 伏苓

二兩 白朮三兩 芒消二兩 十一味切水七升煮取三升

去滓下芒消分三服

治小腸病方第十六

病源論云小腸氣盛為有餘則病小腸契雄竭干

澀少腹脹是為小腸之氣實也則宜瀉之小腸不

足則寒氣容之而腸病驚跳不言アルトキニハ下利去是

為小腸氣之虛也則宜補之

千金方治小腸虛寒痛下赤白腸滑腹中懊憹

補湯方 干薑三兩 當歸四兩 黃蘗四兩 地榆皮

四兩 黃連三兩 阿膠三兩 石楠皮三兩

治少腹脹是為小腸之氣實也則宜導之小腸不
足則寒氣客之而腸病驚跳不言乍來乍去是

為小腸氣之虛也則宜補之

千金方治小腸虛寒痛下赤白腸滑腹中懷懷

補湯方 干薑三兩 當歸四兩 黃蘗四兩 地榆皮

四兩 黃連三兩 阿膠三兩 石柏皮三兩

七味水七升煮取二升五合去滓下膠煮稀分三服

又治小腸實熱腹中瘕紫胡瀉陽方

紫胡三兩 橘皮三兩 黃芩三兩 澤馬三兩 枳實三

兩 旋花三兩 升麻三兩 生地黃切升芒消三兩

九味切以水升一煮取三升去滓下芒消分三服

治腸病方第十七

病源論云腸氣盛為有餘則病腹內胃不安身軀

習是為腸氣之實也則宜導之腸氣不足其氣上

溢而口苦善大是臨宿汁心澀如人時補之登中介

數啞是為腸氣之虛也則宜補之

千金方治腸府實熱精神不守寫熱半夏十重水

湯方半夏三兩 酸棗五合 黃芩一兩 遠志二兩

伏苓二兩 宿薑三兩 生地黃五兩 凡八物細切取長

流水五斗先煮林米令蟹目沸揚之三升過澄清

取六升煮藥取二升分三服

治胃病方第十八

病源論云胃氣盛為有餘則病腹腹脹氣滿是為

湯方半匁三兩 酢來五合 黃芩一兩 遠志二兩

伏苓二兩 宿薑三兩 生地黃五兩 凡八物細切取長

流水五斗 先煮枳米令蟹目沸揚之三斗過澄清

取六升煮藥取二升半分三服

治胃病方第十八

病源論云胃氣盛為有餘則病腹腹脹氣滿是為

胃氣之實也則宜瀉之胃氣不足則飢而不食穀

食泄瀉遂是為胃氣之虛也則宜補之

千金方治胃虛冷少氣口苦身體無澤補胃湯方

防風二兩 栝子人二兩 吳茱萸三兩 細辛二兩 甘草一

兩 桂心二兩 橘皮二兩 芍藥二兩 人參三兩 凡九味

切以水一斗煮取三升分三服又主治胃實胃熱湯

方 支子人三兩 芍藥四兩 白朮五兩 伏苓二兩 生地

黃汁一升 夜干三兩 牛麻三兩 赤蜜一升

八味切以水七升煮取一升五合去滓下地黃煮兩

沸次下蜜煮取三升分三服老小以意

治膀胱病方第十九

病源論云五穀五味之津液悉歸於膀胱氣化分入

血脉以成骨髓也而津液之餘者入肥則為小便不通

小腹偏腫痛是為膀胱氣之實也則宜瀉之勝

胱氣不足則寒客之胞滑小便數而多也面黑是

膀胱氣之虛也則宜補之 千金方云旁光

病者少腹滿腫而痛以手按則欲小便而不得

血脉以成骨髓也而津液之餘者入肥則為小便不通

小腹偏腫痛是為膀胱氣之實也則宜寫之勝

膀胱氣不足則寒客之胞滑小便數而多也面黑是

勝膀胱氣之虛也則宜補之千金方云旁光

病者少腹滿腫而痛以手按則欲小便而不得

又云治旁光腎冷飢不欲食面黑如炭方慈石六兩

黃耆三兩枳中四兩白石莫五兩五味四兩伏苓三

兩木五兩七味水九升煮取三升分三服又云治旁光

實契方艾子人三兩石膏八兩伏苓三兩淡竹葉

切一升生地黄切一升蜜一升知母三兩七味水七

升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分三服須臾再服

三兩

治三焦病方第廿

病源論云三焦盛為有餘則脹氣滿於皮膚內輕然

而不牢或小便澀或大便難是為三焦之實也則宜寫

之三焦氣不足則寒氣客之病遺尿或泄利或胃

滿或食不消是三焦之氣虛也宜補之

千金方云三焦病者脹氣滿小腹尤堅不得小便窘

急溢則為水田則為腹脹又云治上焦虛寒短氣

語聲不出黃耆理中湯方黃耆二兩桂心二兩

丹參四兩桔梗三兩乾薑三兩五味子三兩伏苓

三兩甘草三兩杏仁四兩芍藥三兩十味切以水

千金方云三焦病者脹氣滿三焦小腹九堅不得小便急也窘

急溢則為水三焦田則為腹脹急也又云治上焦虛寒短氣

語聲不出黃耆理中湯方 黃耆二兩桂心二兩

丹參四兩桔梗三兩乾薑三兩五味子三兩伏苓

三兩甘草三兩杏仁四兩芍藥三兩十味切以水

九升煮取三升分三服 又云治上焦實契腹滿

而不欲食或食先噎而後下急也時後胃痛麥門冬

理中湯方 生麥門冬一升 生薑四兩 甘草二兩人參

三兩伏苓二兩 橘皮三兩 竹茹一升 生蘆根切升

尊心五合藥藥米一升 白朮五兩 萎蕤三兩

十二味切水一斗五升煮取三升分三服

又云治中焦實契閉也關塞上下不通障絕閉也關格不吐不

下腹鼓薄皮急急也大黃芎藭開開也格通障絕九味湯方

蜀大黃三兩切水一升黃耆三兩澤陽三兩升麻三兩

零羊角四兩 艾子人四兩 生地黃汁一升生玄參八兩

芒消三兩 九味以水七升煮八物取二升三合下大黃更

煎數沸急也飲去黃急也澤下芒消分三服

又云治中焦虛寒洞泄下利或因霍亂後寫黃白無

度腹中虛痛黃連急也煎方 金色黃連四兩黃蘗三兩

當歸三兩 厚朴三兩乾薑三兩 酸石榴皮四兩 地榆

四兩阿膠四兩 八味以水九升煮七物取一升去滓下

阿膠更煎取烱分三服 又云治下焦虛寒損或

更薄後見血此為血虛或利下或不利好因勞冷而

又治中焦虛寒洞泄下利或因霍亂後寫黃白無

度腹中虛痛黃連藥方 金色黃連四兩黃蘗三兩

當歸三兩 厚朴三兩乾薑三兩 酸石榴皮四兩 地榆

四兩阿膠四兩 八味以水九升煮七物取一升去滓下

阿膠更煎取烱分三服 又治下焦虛寒損或

便轉後見血此為近血或利下或不利好因勞冷而

發續斷止血湯方 續斷三兩 當歸三兩 干薑四兩

甘草一兩乾地黃四兩桂心三兩 六味切以水九升煮

八物取三升五合去滓下阿膠更烱取烱洋盡下補

黃分三服 又治下焦契大少便利不通紫胡泄

通塞湯方

紫胡三兩 黃卷三兩 橘皮三兩 澤馬三兩

文子人四兩 石膏六兩 零羊角三兩 生地黄

切一升 香豉一升 葵 世消三兩 十味以水斗

煮九物取三升去滓下芒消分三服

治氣病方第廿一

千金方治氣極虛寒以毛焦津液不通鼻旁百病

氣損黃耆湯方 黃耆四兩 人參二兩 干姜十枚

生薑八分 白朮二兩 桂心二兩 六味切以水八升煮取三

升分四服 又理氣丸治氣不足方 杏仁一兩 益

智子二兩 廣薑二兩 桂心一兩 四味丸如梧子未食服

三丸以知為度

治脈病方第廿二

氣損黃耆湯方 黃耆四兩 人參二兩 干姜十枚

生薑八分 白朮二兩 桂心二兩 六味切以水八升煮取三

升分四服 又之理氣丸治氣不足方 杏仁一兩 益

智子二兩 廣薑二兩 桂心一兩 四味丸如梧子未食服

三丸以知為度

治脉病方第廿二

千金方治脉虛驚跳不定方 主小腸府寒補

調中防風丸方 防風十二分 桂心十二分 通草十二分

伏神十二分 遠志十二分 甘草十二分 人參十二分 麥門冬

十二分 白石英十六分 九味檮蒂為散 白蜜和丸如梧子

酒服十丸日再服至亦為割 又之治脉實洪滿主心實

病并麻湯方 蜀椒麻三兩 艾子人三兩 生地黄切一升

子荅三兩 澤陽三兩 淡竹葉三兩 芒消三兩

七味以水九升煮取三升去滓下芒消分三服

治筋病方第廿三

刪繁方治筋虛實暴橫絕極或因霍亂轉動腹

滿並轉痛或因服藥吐利過甚脚平虛轉腹轉痛

人參湯方 人參二兩 厚朴二兩 葱白一庖 白朮

兩 藜一把 五物切以水五升煮取二升去滓分再服

又云治轉筋霍亂後因而筋轉方 取絮巾若綿灸

燬以縛筋上 又云胞轉筋急方 白朮四兩 香豉

一升 艾子人二兩 榆白皮三兩 子荅三兩 通草二兩

伏苓二兩 七物切以水七升煮取三升去滓分三服

人參湯方 又為二兩 厚朴二兩 葱白一握 白朮

雨 藜一把 長三寸 五物切以水五升煮取二升去滓分再服

又云治轉筋霍亂後因而筋轉方 取絮巾若綿灸 急極也

煖以縛筋上 又云胞轉筋急方 白朮四兩 香豉 麻果云新加也或云云柳花

一升 葵子人二兩 榆白皮三兩 子芩三兩 通草二兩 アケヒカヲ

伏苓二兩 七物切以水七升煮取三升去滓分三服

又云治轉筋陰囊卵縮入腹之中絞痛後交接極

損所為方 ナセル

取化子一頭 杖撞卅六下 放於中逐之使啼極刺腸 ツクマツ

下取血一升以酒一升共和飲之若無酒單酒五升好切金

冷澁也 又云治交接損縮卵筋急方 燒婦人月經 ヒヤシ コシセ

衣服方寸匕 已上千金 方同之 又云治轉筋十指筋急不得 ヒヤシ

屈申別法 灸千髀上七炷大良 又云治轉筋脛骨 カメノノル

痛不可忍方 灸屈膝下廉橫筋上三炷 カメノノル

又云轉筋方 灸湧泉、心在脚心下當母 オホヒ

指大筋是灸七炷 又方灸大都、心在足母指大 オホヒ

節內側白肉際七炷 又云腹脇轉筋方 灸膺上 カメノノル

一寸十四炷 又云治筋絕方 雙髀足髓灸內瘡中 カメノノル

筋即續矣 ナセル

千金方治筋實極手足爪甲或青或黃或黑或赤筋急

煩地黃煎方 地黃汁三升 生葛汁一升 生玄參汁升 オシクセ

大黃二兩 艾子三兩 升麻三兩 石膏五兩 久藥四兩 オシクセ

麻黃三兩 犀角三兩 干味水七升 煮七物取二升去滓 カメノノル

也黃汁兩升 煮次下葛汁等 煮取三升三服 オシクセ

筋即續矣

千金方治筋實極手足爪甲或青或黃或黑或筋急

頑地黃^九方地黃汁三升生葛汁一升生玄參汁升

大黃二兩艾子三兩升麻二兩石膏五兩久藥四兩

麻黃三兩犀角三兩干味水七升煮七物取二升去滓

地黃汁兩沸次下葛汁等煮取三升三服

治骨病方第廿四

邪繁方云凡骨虛實之應主于腎膀胱若其府藏

有病從骨生熱則應藏寒則應府凡骨虛者疼

不安好倦骨實者苦煩熱又治骨實苦煩熱

鷄子白^方藥方通四時用鷄子七枚^{和用取白}生地黃汁一升

麥門冬汁三合赤蜜一升凡四汁相和攪調微火上

煎之三沸分三服桂要方療骨虛勞冷骨節疼

痛無力致二升地黃八兩再過^方曝乾從食後以酒

一升服之再治虛熱

治髓病方第廿五

椰繁方云凡髓虛實之應主于肝膽若其府藏有

病從髓生熱則應藏寒則應府凡髓虛者病

惣不定^方髓實者勇^方幹又治髓實勇^方幹驚悸

肝熱紫胡^方散泄湯方紫胡三兩升麻三兩黃芩三兩

澤^方馬四兩細辛三兩枳實三兩淡竹葉切一升艾子

人三兩生地黃切一升芒消凡十物以水九升煮取三

升去滓下芒消分三服

千金方治髓虛痛也

病後髓生。契則應藏寒。則應府。凡髓虛者。病
 惣不定。髓實者。勇。幹。又云。治髓實。勇。幹。驚。契。主。

肝契紫胡荽泄湯方
紫胡三兩
升麻三兩
黃芩三兩

澤馬ナニ四兩
細辛アラノネクセ三兩
枳實カラタチ三兩
淡竹葉アハタケ切一升炙子

人三兩
七不
生地黃切一升
芒消
凡十物以水九升煮取三

升去滓下芒消分三服
千金方治髓虛痛惚不

女
瞻
府
中
寒
羌
活
補
髓
丸
方
羌
活
三
兩
桂
心
三
兩

芍藥三兩 當歸三兩 人參四兩 桑肉一升 研為暗

天麻子二升アセノア
為脂研
羊髓一升
蒜一升半髓
一升十味

前。鴆。五。種。千。藥。為。散。下。來。膏。麻。人。更。鴆。相。濡。為。一。

家下二髓內銅銑中湯中煎之取好為丸如梧子酒

服卅九日再加之至卅九

治皮病方第六

那繁方言凡皮虛實之應主干拂大腸其病茲於

皮毛。熱則應藏。寒則應府。凡皮虛者寒。皮實者熱。

又主治皮虛主大腸病寒氣用枳朮藿並湯方

菊藿根茎切三升
 桃枝葉剉三升
 細糠一斗
 秫米五升

昌蒲根葉剉二升
凡五物水一石五斗煮取米熟為度

大ナ 盆ハシ 器キ 貯シメ 盆ハシ 上ウヘ 作ス 少シ 竹タケ 床トコ 子シ 置ク 盆ハシ 人ヒト 身ミ 坐マ 床トコ 中ナカ 面オモテ

周ル週ル持シ持シ鷹カウ席シ圍カウ身上シ以シ衣カウ被シ蓋シ覆シ若シ氣カウ急シ時シ用シ孔シ封シ

中泄氣取對通另接行可作兩食久許如守三日差還

燭葉足汗用之若匱裏不過契匱下豈失也非但

治寒法是皮膚一切勞冷並皆治之

昌補根葉生二升凡五物水一石五斗考車才與並房

大瓮器貯瓮上作少竹床子置瓮人身坐床中四面

周迴持麈尾圍身上以衣被蓋覆若氣急時用孔射

中泄氣取對通方樓汗可作兩食久許如牛三日差還

燭葉足汗用之若瓮裏不過熱瓮下置炭火也非但

治寒法是皮膚一切勞冷並皆治之

又治皮膚主肺病熱氣所加文子藥方

文子人三兩生地黃切一升枳實三兩石膏八兩大青

三兩杏人三兩淡竹葉切一升紫胡三兩生玄參五兩

甘消三兩凡十物切以水九升煮取三升去滓下芒消

平旦分三服已上千金方同之

治定病方第七

郡繁方凡定虛實之應主脾胃若其府藏有病從

肉生勢則應藏寒則應府

凡定虛者生不平席多危動定實者生不平動氣

又治定虛生不平席好動主胃病寒氣所加五茄

方通四時用五茄皮二升苟杞皮二升干地黄八兩丹參八

兩枳仲一斤干薑四兩附子三兩炮鍾乳床一斤研

凡八物吹咀橙子野之清酒二斗漬之三宿一服七

合日再服又治定實生平席不動喘氣主脾病熱

氣格半夏湯除喘方通四時用半夏八兩洗宿薑八兩

細辛三兩杏人五兩橘皮四兩麻黃三兩石膏七兩

碎夜十二兩凡八物切水九升煮取三升去滓分三服

負利下如生有三月

咳喘麻栲
之義也
栲之如大
豆也

象凡八物アヘタチ吹フク咀ク橙子貯之清酒二斗漬之三宿一壓

合日再服又治イ定實モハ生平ホソクア席不動喘ヒレ氣主脾病契

氣拾半夏湯除喘方ソクアヘキ通四時用半夏八兩ホソクア洗宿薑八兩

細辛三兩アラネクセ杏仁五兩カラネアヘキ橘皮四兩カハネクセ麻黃三兩シラネ石膏七兩

碎カラネアヘキ夜干二兩凡八物切水九升カラネアヘキ煮取三升去滓分三服

須利下加芒消三兩アヘ

醫心方卷第六